

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ÉDITION DE LA STATION "BRETAGNE"

(COTES-DU-NORD, FINISTÈRE, ILLE-ET-VILAINE, MORBIHAN)

SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

280, rue de Fougères, 35000 RENNES — Tél. (99) 36-01-74

ABONNEMENT ANNUEL : 50 F

Sous-Régisseur de recettes de la D. D. A.
PROTECTION DES VÉGÉTAUX

C. C. P. RENNES 9404-94

BULLETIN N° 53

27 AOÛT 1976

CARPOCAPSE DES POMMES ET DES POIRES

Le climat demeurant favorable à l'activité de cet insecte, des dégâts sont encore à craindre au cours des prochaines semaines dans notre région. Les plus graves risquent de se produire dans les vergers situés à proximité de pommiers à cidre non traités.

Afin de prévenir ces attaques, nous conseillons d'effectuer un nouveau traitement dans la période du 30 août au 1er septembre.

Bien respecter les délais d'emploi avant récolte.

LUTTE CONTRE LES CHENILLES DE NOCTUELLES (vers gris)

Des chenilles de noctuelles occasionnent des dégâts importants sur diverses cultures et plus particulièrement sur choux et colza. Ainsi que nous l'avons indiqué dans le bulletin du 9 juin dernier, la lutte classique consiste en l'épandage d'appâts à base de carbaryl, de chlorpyrifos, de lindane, de phoxime ou de toxaphène.

En raison de la sécheresse, il est apparu cependant que les appâts du commerce perdaient toute attractivité. Face à cette situation, nous conseillons de confectionner à la ferme un mélange de son et d'insecticide, à humecter et à épandre à la tombée de la nuit pour éviter qu'il ne se dessèche trop rapidement. Nous avons constaté l'efficacité du carbaryl ainsi employé et pensons que les autres insecticides préconisés ci-dessus devraient également donner satisfaction, mais nous n'avons pu le vérifier.

Confection de l'appât : à 100 kg de son, mélanger soigneusement 6 kg de l'une des spécialités suivantes à base de carbaryl : Sevin L 85, Minotor C, Kumital, Prosévor 85.

Le mélange doit être fait à sec. Juste avant l'emploi, ajouter progressivement la quantité d'eau nécessaire pour bien humidifier le son.

Épandage de l'appât : il est indispensable de l'effectuer le soir à la tombée de la nuit de façon que l'appât soit encore humide lors de la sortie des chenilles.

Si l'attaque est généralisée, faire l'épandage à la volée sur l'ensemble de la parcelle à raison de 40 à 50 kg/ha. Cette quantité peut être doublée en cas de forte infestation et si les larves sont déjà grosses.

Lorsque l'attaque est localisée et progresse suivant un front, limiter l'épandage à la zone des dégâts, sur une bande de quelques mètres de largeur.

L'Ingénieur et le Technicien
chargés des Avertissements Agricoles,

G. PAITIER et M.P. VANNIER

L'Ingénieur en Chef d'Agronomie
Chef de la Circonscription
phytosanitaire "Bretagne"

J. DELOUSTAL

Dernière note: bulletin n° 52 du 9 août 1976

772